

شماره

تاریخ

(۱)

پایه نهم شیمی هم

فصل ۱

۱. خود را با یادگیری صفحه ۳ (آ) در زمین، آهن و در سیاره مشتری، هیدروژن فراوان ترین عنصر است.  
 (ب) اکسیژن و گوگرد (پ) سیاره مشتری (ت) از جنس کازالیت زیرا عنصرها  
 ساخته آن، فرمهایی هستند که گازند یا به آن نمی گزاید تبدیل می شوند برای نمونه اکسیژن و  
 گوگرد می توانند به شکل  $CO_2(g)$  و  $SO_2(g)$  نیز موجود باشند.  
 (ث) در زمین عنصرهایی مانند طلا، نقره، مس، کروم، پلاتین و ... (انفرجایی است)  
 کربن، نیتروژن، ید و ... یافت می شوند.

۲. چونید با ریاضی صفحه ۴

$$m = 0.024 \text{ g} = 2.4 \times 10^{-3} \text{ g} = 2.4 \times 10^{-7} \text{ kg}, \quad c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1} \quad (1)$$

$$E = mc^2 = (2.4 \times 10^{-7} \text{ kg}) (3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1})^2 = 2.16 \times 10^{11} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2} = 2.16 \times 10^{11} \text{ J}$$

$$\frac{\text{زوب ۱ g آهن}}{\text{زوب } x \text{ g}} = \frac{2.16 \text{ J}}{2.16 \times 10^{11} \text{ J}} \rightarrow x = 8.74 \times 10^8 \text{ g} \quad (ب)$$

\* در اینجا اگر با تناسب حل شود، اگر آن آن برآورد اما پس از تبدیل عمل دکمه تبدیل به صورت

$$\text{حل شود: } ? \text{ g Fe} = 2.16 \times 10^{11} \text{ J} \times \frac{1 \text{ g Fe}}{2.16 \text{ J}} = 8.74 \times 10^8 \text{ g}$$

۳. حجم بند ششم صفحه ۶

۱- (آ) شباهت ها: نادر شیمیایی، تعداد اکترون و خواص شیمیایی.

تفاوت: A، N، نیم عمر، پایداری، خواص فیزیکی و رابطه به حجم، درصد فراوانی در طبیعت.

(ب) سه ایزوتوپ ( $^1_1\text{H}$ )، ( $^2_1\text{H}$ ) و ( $^3_1\text{H}$ ) (پ)  $^4_2\text{He}$  که نیم عمر کوتاه تری دارد.

(ت) به جز  $^1_1\text{H}$  و  $^2_1\text{H}$ ، ۵ ایزوتوپ پرتوزا هستند.

(ث) " " " " " " " " دیگر.

(ج) " " " " " " " " "

۲

شماره

تاریخ

۲-

$$\text{درصد فراوانی } {}^4\text{Li} = \frac{\text{تعداد اتم } {}^4\text{Li}}{\text{تعداد اتم ها در نمونه}} \times 100 = \frac{3}{50} \times 100 = 6\%$$

برای محاسبه درصد فراوانی  ${}^7\text{Li}$  در نمونه دو راه وجود دارد:

آ) مجموع درصد فراوانی این دو توپ ها برابر با ۱۰۰٪ است. از این رو درصد فراوانی  ${}^3\text{Li}$  برابر با ۹۴٪ خواهد بود.

$$\text{ب) درصد فراوانی } {}^3\text{Li} = \frac{\text{تعداد اتم } {}^3\text{Li}}{\text{تعداد اتم ها در نمونه}} \times 100 = \frac{47}{50} \times 100 = 94\%$$

« نهم بند ششم » ص ۹

گلوکز در بدن انسان یکی از مهم ترین منابع تامین غذا و انرژی برای سلول است، از این رو رشد غیر عادی و سریع سلول در قسمتی از بدن با مصرف سریع و غیر عادی گلوکز آشکار و تشخیص دوره سرطان

می شود. گلوکز نشان دهنده  ${}^{18}\text{F}$  که بیشترین آتم H شده است، بهترین گزینه برای تشخیص دوره سرطان است.


« خود را با بازتابید » ص ۱۳ - ۱

Al ۱۳ : دوره سوم ، گروه ۱۳

Ca ۲۰ : " " ، گروه ۲

Mn ۲۵ : " " ، گروه ۷

Se ۳۴ : " " ، " ۱۶



شماره

تاریخ

۲-  $Ar$  ۱۸ ، زیرا  $He$  ۲ و  $Ar$  ۱۸ هر دو در گروه ۱۸ جدول دوره چهارم دارند از این دو فرمتاری مشابه خواهند داشت .

۳-  $Ga$  ۳۱ ، زیرا  $Al$  ۱۳ و  $Ga$  ۳۱ هر دو از عنصرهای گروه ۱۳ جدول دوره چهارم هستند و در ترکیب که می توانند با فرمتاری مشابه ، کاتیون با بار مثبت  $+3$  بدید لوزند .

۱۵ به هم میزنیم . صفحه

| اسم | نماد ایزوتوپ | عدد ایزوتوپ (عدد جرمی (A)) | جرم اتم میانگین |
|-----|--------------|----------------------------|-----------------|
|     | ${}^7_3Li$   | ۹۴                         | ۷٫۹۴            |
|     | ${}^6_3Li$   | ۷                          |                 |

$$b) \dots + (\text{فردا آن} \times \text{جرم اتم ایزوتوپ دوم}) + (\text{فردا آن} \times \text{جرم اتم ایزوتوپ اول}) = \text{جرم اتم میانگین}$$

(مجموع فردا آنی ها در طبیعت که برابر با ۱۰۰ است)

\* اگر جرم اتم هر ایزوتوپ را برابر با عدد جرمی آن در نظر بگیریم:

$$\text{جرم اتم میانگین } Li = \frac{(7amu \times 7) + (94amu \times 94)}{100} = 7.94 \text{ amu}$$

$$c) \text{جرم اتم میانگین } Cl = \frac{(35amu \times 75.8) + (37amu \times 24.2)}{100} = 35.48 \text{ amu}$$

ب) در جدول دوره ۱ جرم اتم میانگین کربن  $12.01 \text{ amu}$  درج شده است . با توجه به این که جرم پروتون و نوترون اندکی از  $1 \text{ amu}$  بیش تر است باید جرم اتم میانگین کمی بیشتر از

$12.01 \text{ amu}$  شود. اما چرا بین تمیز شده است ؟ در سبب بالا پروتون و نوترون به صورت جدا از هم در نظر گرفته شده در حالی که هنگام تشکیل هسته بسیار بهم چسبندگی از هم جدا مطابق  $E=mc^2$  به انرژی تبدیل می شود که به آن انرژی بستگی گفته می گویند. در واقع جرم اتم میانگین درج شده در جدول دوره ای از مجموع جرم پروتون ، نوترون و الکترون بجز  $amu$  که تر است .

(۴)

| جرم ۱ عدد (گرم) | جرم ۵۰ عدد (گرم) | (آ) |
|-----------------|------------------|-----|
| ۴۵              | ۲۲۵              |     |
| ۰.۵۶            | ۲.۸              |     |
| ۰.۲۲            | ۱.۱              |     |
| ۰.۰۲            | ۱.۰              |     |

ب) ترازور و جینا (هفتاد و هفت عدد ۱۶) تا یک صدم گرم را نشان می دهد، در واقع وقت آن ۱۰۰ ± گرم است، از این روش می توان جرم یک عدد کاغذ آ ۴۱۰ عدد و برج را با آن اندازه گیری کرد.

پ) جرم کم ترین تعداد ممکن و قابل شمارش را با ترازور اندازه گیری نموده سپس جرم نمونه را به تعداد دانه ها در پاک شیر تقسیم می کنیم تا جرم میانگین یک دانه حاصل شود به دست آید.

ت) خرد کردن الزامی نیست که میانگین مربوطه از دانه ها برابر با یکی از آنها باشد. برای نمونه ممکن است میانگین آزمون شیمی در کلاس درس باشد ۱۴۰۸ یا بیشتر بدیهه است که نمونه برگه آزمون هیچ دانش آموزی ۱۴۰۸ نخواهد بود زیرا دانه ها در برج ممکن است به لحاظ اندازه، جرم و همین اندکی متفاوت از یکدیگر باشند.

شماره  
تاریخ

۵

نمونه باربندی «صفحه ۱۷»

۱- در اینجا اگر با تناسب حل شود، در آن آن برابری است:

$$\frac{1 \text{ atom H}}{x \text{ atom H}} = \frac{1,77 \times 10^{-24} \text{ g}}{1 \text{ g}} \rightarrow x = 7,102 \times 10^{23} \text{ atom H}$$

اما پس از تبدیل کسر «عقل» تبدیل باید به صورت زیر حل شود:

$$? \text{ atom H} = 1 \text{ g} \times \frac{1 \text{ amu}}{1,77 \times 10^{-24} \text{ g}} \times \frac{1 \text{ atom H}}{1 \text{ amu}} = 7,102 \times 10^{23} \text{ atom H}$$

$$-2 \quad (N_A = 7,102 \times 10^{23})$$

$$? \text{ g H} = 7,102 \times 10^{23} \text{ atom H} \times \frac{1,77 \times 10^{-24} \text{ g}}{1 \text{ atom H}} = 1 \text{ g H}$$

نمونه باربندی «صفحه ۱۹»

$$? \text{ g Al} = 5 \text{ mol Al} \times \frac{27 \text{ g Al}}{1 \text{ mol Al}} = 135 \text{ g Al} \quad (-1)$$

$$? \text{ mol S} = 71,5 \text{ g S} \times \frac{1 \text{ mol S}}{32 \text{ g S}} = 2,234 \text{ mol S} \quad (-)$$

$$? \text{ atom Zn} = 0,2 \text{ mol Zn} \times \frac{7,102 \times 10^{23} \text{ atom Zn}}{1 \text{ mol Zn}} = 1,4204 \times 10^{23} \text{ atom Zn} \quad -2$$

$$? \text{ mol Cu} = 9,83 \times 10^{23} \text{ atom Cu} \times \frac{1 \text{ mol Cu}}{7,102 \times 10^{23} \text{ atom Cu}} = 1,384 \text{ mol Cu} \quad -3$$

$$? \text{ g Cu} = 1,384 \text{ mol Cu} \times \frac{63,55 \text{ g Cu}}{1 \text{ mol Cu}} = 87,96 \text{ g Cu}$$

نمونه باربندی «صفحه ۲۱»

هر چه طول موج نور نشر شده کوتاه تر باشد، اثری و در نتیجه دمای آن بیش تر است، از این رو به شعاع آبی رنگ اجاق گاز ما که  $2750^\circ\text{C}$  و شعله شمع، دمای  $1750^\circ\text{C}$  نسبت داده می شود و دمای  $800^\circ\text{C}$  مربوط به شعله صنعتی است.

4

شماره

تاریخ

« خود را بیایید » صفحه ۲۳ صد و نودن است، زیرا تعداد نوارها رنگی و جا بجا، آرزو با طیف نوری خطی هیدروژن همخوانی دارد.

\* این پرسش نشان می دهد که برای تعیین نوع عنصر باید طیف نوری آن با رنگها (اصلی) مقایسه کرد، در واقع به خاطر سپردن طیف نوری خطی عناصر خبره اهداف نیت.

« با هم بیاییم » صفحه ۲۸

۱- در هر ردیف، رنگ نوارچی شامل ۲ عنصر، رنگ آبی شامل ۶ عنصر، رنگ سبز شامل ۱۰ عنصر و رنگ زرد شامل ۱۴ عنصر است.

ب) لایه دوم از دو بخش تشکیل شده است که یکی پنج نوار ۲+۲ الکترون و دیگری پنج نوار ۴ الکترون را دارد.

پ) چهار نوع زیر لایه وجود دارد که به ترتیب پنج نوار ۲، ۶، ۱۰ و ۱۴ الکترون دارند.

$$a_0, a_1, a_2, \dots, a_l$$

$(l \geq 0)$

۲-۱) در یک دنباله عددی:

$a_0$  جمله نخست،  $a_1$  جمله دوم و ...  
جمله عمومی (یا  $n$ ام) است. هر جمله از جمله پیش از خود به اندازه قدر ثابت  $(y)$  بیش تر و از جمله پس از خود به اندازه آن کم تر است.

$a_0 =$  جمله نخست

$$a_1 = a_0 + (y)$$

$$a_2 = a_0 + 2(y)$$

⋮

$$a_l = a_0 + l(y)$$

دنباله موجود در پرسش چنین است:

$$a_0 = 2$$

$$a_1 = 2 + 4$$

$$a_2 = 2 + 2(4)$$

⋮

$$a_l = 2 + l(4) \longrightarrow a_l = 4l + 2$$

شماره  
تاریخ

۷

\* توجه: چرا که همی در این آزمون به  $a_l = 4l - 2$  می رسند؟  
دنباله عددی هتکامی که  $a_l$  باشد بصورت زیر نوشته می شود:

$$a_1, a_2, \dots, a_l$$

$$a_1 = \text{عدد نخست}$$

$$a_2 = \text{عدد دوم} = a_1 + y$$

$$a_3 = \text{عدد سوم} = a_2 + 2(y)$$

$$a_l = \text{عدد } l \text{ام} = a_1 + (l-1)y$$

به همین دلیل اگر هتکار محترم دنباله را بصورت زیر در نظر بگیرد:

$$a_1 = 2$$

$$a_2 = 2 + 4$$

$$a_3 = 2 + 2(4)$$

$$a_l = 2 + (l-1)4 \rightarrow a_l = 2 + 4l - 4 = 4l - 2$$

عدد عمومی  $4l - 2$  به دست می آید که در آن  $a_l$  باید باشد.

|              |           |           |            |            |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| زیر لایه     | ۲ اکترونی | ۶ اکترونی | ۱۰ اکترونی | ۱۴ اکترونی |
| تعداد مجاز ل | ۵         | ۱         | ۲          | ۳          |

ب) \* توجه کنید ل خاد و نوع زیر لایه را نشان می دهد و شمار مقدرها ل هر مقدره از شمار زیر لایه را در آن لایه اکترونی مشخص می کنند.

| شمار زیر لایه         | S | p | d  | f  |
|-----------------------|---|---|----|----|
| حداکثر تعداد زیر لایه | ۲ | ۶ | ۱۰ | ۱۴ |
| تعداد مجاز ل          | ۵ | ۱ | ۲  | ۳  |

ج) زیر لایه پنجم ( $l=4$ ) حداکثر کبلی شمر  $4l + 2 = 4(4) + 2 = 18$  اکترون را دارد.





شماره

تاریخ

نمودار ایازنامه « صفحه ۳۲

| آرایش الکترونی                                     | نماد شیمیایی عنصر |
|--|-------------------|
| $1s^2 2s^2 2p^4$                                   | ۸O                |
| $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$                         | ۱۸Ar              |
| $1s^2 \text{ " " " " } \Sigma s^2$                 | ۲۰Ca              |
| $\text{ " " " " " } 3d^{10} \Sigma s^2 \Sigma p^3$ | ۳۳As              |
| $\text{ " " " " " " } \Sigma p^4$                  | ۳۴Se              |



\* بیرونی ترین لایه الکترونی، بزرگترین n است، از این رو برای دوام کمترین در مس، بیرونی ترین زیر لایه، s می باشد.

نمودار ایازنامه « صفحه ۳۳

| نماد عنصر  | ۳Li | ۸O | ۱۰Ne | ۱۴Si | ۲۰Ca | ۲۷Co | ۳۵Br |
|------------|-----|----|------|------|------|------|------|
| شماره گروه | ۱   | ۱۶ | ۱۸   | ۱۴   | ۲    | ۹    | ۱۷   |
| شماره دوره | ۲   | ۲  | ۲    | ۳    | ۴    | ۴    | ۴    |

| نماد عنصر | آرایش الکترونی فشرده                 | شماره لایه ظرفیت | تعداد الکترون ظرفیت |
|-----------|--------------------------------------|------------------|---------------------|
| ۳Li       | $[He] 2s^1$                          | ۲                | ۱                   |
| ۸O        | $[He] 2s^2 2p^4$                     | ۲                | ۶                   |
| ۱۰Ne      | $[He] 2s^2 2p^6$                     | ۲                | ۸                   |
| ۱۴Si      | $[Ne] 3s^2 3p^2$                     | ۳                | ۴                   |
| ۲۰Ca      | $[Ar] \Sigma s^2$                    | ۴                | ۲                   |
| ۲۷Co      | $[Ar] 3d^7 \Sigma s^2$               | ۴                | ۹                   |
| ۳۵Br      | $[Ar] 3d^{10} \Sigma s^2 \Sigma p^5$ | ۴                | ۷                   |





خود را بنامید «صفحه ۳۵ (۱)

|                       |                      |                      |                                      |                                   |                                   |                     |                     |                     |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| عنصر                  | ۳Li                  | ۴Be                  | ۵B                                   | ۶C                                | ۷N                                | ۸O                  | ۹F                  | ۱۰Ne                |
| آرایش الکترونی فشرده  | [He] ۲s <sup>۱</sup> | [He] ۲s <sup>۲</sup> | [He] ۲s <sup>۲</sup> ۲p <sup>۱</sup> | " ۲s <sup>۲</sup> ۲p <sup>۲</sup> | " ۲s <sup>۲</sup> ۲p <sup>۳</sup> | " " ۲p <sup>۴</sup> | " " ۲p <sup>۵</sup> | " " ۲p <sup>۶</sup> |
| تعداد الکترون ظرفیت   | ۱                    | ۲                    | ۳                                    | ۴                                 | ۵                                 | ۶                   | ۷                   | ۸                   |
| آرایش الکترون نقطه ای | Li.                  | Be.                  | •B.                                  | •C.                               | •N:                               | •O:                 | :F:                 | :Ne:                |
| عنصر                  | ۱۱Na                 | ۱۲Mg                 | ۱۳Al                                 | ۱۴Si                              | ۱۵P                               | ۱۶S                 | ۱۷Cl                | ۱۸Ar                |
| آرایش الکترونی فشرده  | [Ne] ۳s <sup>۱</sup> | [Ne] ۳s <sup>۲</sup> | " ۳s <sup>۲</sup> ۳p <sup>۱</sup>    | " ۳s <sup>۲</sup> ۳p <sup>۲</sup> | " " ۳p <sup>۳</sup>               | " " ۳p <sup>۴</sup> | " " ۳p <sup>۵</sup> | " " ۳p <sup>۶</sup> |
| تعداد الکترون ظرفیت   | ۱                    | ۲                    | ۳                                    | ۴                                 | ۵                                 | ۶                   | ۷                   | ۸                   |
| آرایش الکترون نقطه ای | Na.                  | Mg.                  | •Al.                                 | •Si.                              | •P:                               | •S:                 | :Cl:                | :Ar:                |

ب) مشابه یکدیگر است زیرا الکترون بی ظرفیت برای دارند از این دو شمار نقطه ای برامون نماد شیمیایی آریز یکسان است.

ج) برای عنصرهای گروه ۱ و ۲ ، شمار الکترون بی ظرفیت یا نقطه ای برامون نماد شیمیایی برابر است درحالی که برای عنصرهای گروه ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ کم تر از شمار الکترون بی ظرفیت است.

۵

با هم بنویسیم «صفحه ۳۷

۱- انتظار می رود اتم عنصرهای گروه ۱۳ و ۱۴ با ازدست دادن الکترون، به کاتیون تبدیل شوند و به آرایش گاز نجیب دوره پیش از خود برسند. باید به این نکته با دقت توجه کرد. درحالی که اتم عنصرهای گروه ۱۵ ، ۱۶ و ۱۷ با بدست آوردن الکترون، به آنیون تبدیل شوند و به آرایش الکترونی گاز نجیب پس از خود در همان دوره برسند. برای اتم عنصرهای گروه ۱۴ انتظار می رود ۴ الکترون بدست آورند و ۴ الکترون ازدست بدهند تا به آرایش گاز نجیب برسند (این پیش بینی دانش آموزان می باشد که ممکن درست یا نادرست باشد! سریع قضاوت نکنید!)

تهیه کننده پیش نویس

\* در پرسش هایی که آمده (پیش بینی کنید) باید به این نکته با دقت توجه کرد. در انتظار می رود آغاز شود



۱۳

شماره

تاریخ

با هم بندهشم " صفحه ۳۹


(بدون بار الکتریکی)

۱- نخست نماد شیمیایی کاتیون پس نماد شیمیایی آنیون (را می نویسیم، اما تعداد آنرا را به گونه انتخاب می کنیم که ترکیب یونی حاصل از لحاظ بار الکتریکی منفی باشد، این تعداد را به صورت زیروند برای کاتیون و آنیون می نویسیم.




۳- در جدول نام ترکیب های یونی از بالا به پایین به ترتیب، مننیم اکسید، کلیم کلرید، تیاسیم اکسید، سیم سفید و لیتم برسد است.


و خود را بیان نماید " صفحه ۴۱





۴ تمرین های دوره ۱ " صفحه ۴۲



ب) دوره چهارم و گروه ۸. پ) به دسته d تعلق دارد. ت) بله زیرا از روی آن آهن دارای شش در نتیجه شمار الکترون های کسایشی هستند.





جرم اتمی میانگین منیزیم

$$= \frac{(24 \text{ amu} \times 78,1\%) + (25 \text{ amu} \times 10,13\%) + (26 \text{ amu} \times 11,7\%)}{100} = 24,32 \text{ amu}$$

(ب) همه ایزوتوپ‌های یک عنصر به دلیل این که از یکسان دارند تفاوت مکانی در جدول دوره ای اشغال می‌کنند.

در خازن‌شور می‌توانند

۴- وجود یک خوردگی (یون‌های  $\text{Na}^+$  و  $\text{Cl}^-$ ) باعث رسانایی می‌شود زیرا یون‌ها به یون


قطب‌های نام حرکت می‌کنند، پس از مدتی حرکت انتقالی یون‌ها در بافت گیاهی محدود شده  
 اوجا با وجود میدان الکتریکی، یون‌های سدیم با جذب انرژی شروع به نشر می‌کنند. این فرآیند با  
 ایجاد رنگ زرد در خشان می‌شود (نشر یون‌ها کلرید در گستره فرابنفش است و  
 دیده نمی‌شود).

۱۴

شماره

تاریخ

۵-۳) اتم یُد به  $I^-$  و اتم باریم به یون  $Ba^{2+}$  تبدیل می شود.



بریم یُد  $(BaI_2)$

\* توجه کنید که برای اتم ها با  $Z > 34$  و تعداد رسته دوم باید آرایش الکترونی داده شود پس برای آن پرش طرح گردد.



۶-۳) اگر هر سال را  $365,25$  روز در نظر بگیریم، در یک سال  $(365,25 \times 10^{22})$  اثری از سوی خورشید به سوی زمین گسیل می شود.

$$E = mc^2 \rightarrow (365,25 \times 10^{22}) \text{ J} = m \times (3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1})^2 \quad (ب)$$

$$m \approx 4,7 \times 10^7 \text{ kg} \approx 4,7 \times 10^4 \text{ Ton} \approx 4,9 \times 10^6 \text{ g}$$

$$? \text{ mol C} = 0,37 \text{ g C} \times \frac{1 \text{ mol C}}{12,01 \text{ g C}} \approx 0,3 \text{ mol C} \quad -۷$$

$$? \text{ atom C} = 0,3 \text{ mol C} \times \frac{7,02 \times 10^{23} \text{ atom C}}{1 \text{ mol C}} = 1,87 \times 10^{23} \text{ atom C}$$



۹-۳) (۱) : دوره اول ، گروه ۱۸ (۲) : دوره دوم ، گروه ۱۸

(۳) : دوره سوم ، گروه ۲ (۴) : دوره چهارم ، گروه ۱۰

شماره  
تاریخ

۱۵

ب) اتم‌های شماره (۱) و (۲) ، زیرا لایه‌های اکسرونی آنها به طور کامل از اکسرون پر شده است (اتم گاز نجیب هستند).

ج) با فلزات ترکیب تشکیل نمی‌دهد.  $2p^2 \quad 2s^2 \quad 1s^2 : (۲)$

با فلزات ترکیب یونی تشکیل می‌دهد  $3s^2 \quad 3p^2 \quad 2s^2 \quad 1s^2 : (۳)$



د)  $4s^2 \quad 3d^8 \quad 3p^6 \quad 3s^2 \quad 2p^6 \quad 2s^2 \quad 1s^2$

به جز نوبلاید  $3d^8$  ، دیگر زیر لایه‌ها از اکسرون پر شده‌اند در واقع از جهت زیر لایه آن ، شش زیر لایه به طور کامل از اکسرون پر شده است.

۱۰- برای این کار کافی است هر خط را در طرف نمونه با توجه به جایگاه آن ، با خطوط موجود در اتمی طرف نثری یک یک فلزها مقایسه کنید . با انجام این کار درمی‌یابید که تنها فلزهای مس و جیوه در نمونه وجود دارند.

۱۱- ا) دانش با جمع جرم اتمی اتم‌های  $C$  و  $O$  در  $CO_2$  مولکول کربن می‌توانید جرم مولکولی آن را می‌توانید محاسبه کرده است :

$$CO_2 \text{ جرم مولکولی} = CO_2 \text{ جرم یک مولکول} = 12,01 \text{ amu} + 16,00 \text{ amu} + 16,00 \text{ amu} = 44,01 \text{ amu}$$

ب) جرم یک مول (جرم مولی) کربن می‌توانید  $44,01 \text{ g}$  است به طوری که می‌توان نوشت :  
 $1 \text{ mol } CO_2 = 44,01 \text{ g } CO_2$

$$? \text{ g } CO_2 = 1 \text{ mol } CO_2 \times \frac{6,02 \times 10^{23} \text{ molecule } CO_2}{1 \text{ mol } CO_2} \times \frac{44,01 \text{ amu}}{1 \text{ molecule } CO_2} \times \frac{1,66 \times 10^{-24} \text{ g}}{1 \text{ amu}}$$
$$= 44,01 \text{ g } CO_2$$

ج) جرم مول کربن می‌توانید برابر با جرم اتمی کربن در جدول دوره‌ای نیز به‌صورت  $12,01 \text{ g mol}^{-1}$

ت)  $Cl_2 = 70,9 \text{ g mol}^{-1}$  ،  $HCl = 36,46 \text{ g mol}^{-1}$  ،  $NaCl = 58,44 \text{ g mol}^{-1}$  ،  $CaF_2 = 78,07 \text{ g mol}^{-1}$  ،  $SO_3 = 80,06 \text{ g mol}^{-1}$  ،  $Al_2O_3 = 101,96 \text{ g mol}^{-1}$

شماره  
تاریخ

۱

۱

فصل دوم

« با هم بنویسیم » صفحه ۴۷

۱- آ) بله ، با افزایش ارتفاع از سطح زمین ، دما در هر ستره معین ، چشم گیر اما نامنظم تغییر می کند ، این ویژگی نشان دهنده لایه ابر بودن هواگرم است .

ب) بله ، یون ها (کاتیون و آنیون) ، زیرا هر چه از سطح زمین دور شویم امکان برخورد پر توها را کم می کنیم با اتم های موجود در لایه های بالایی هواگرم بیش تر می شود و این فرایند باعث جدا شدن اکترون ها و تشکیل یون در مثبت می شود  
از آنجا

۲- فشار کاهش می یابد ، زیرا مطابق شکل با افزایش ارتفاع از سطح زمین ، شمار مولکول های ساکننده هواگرم در واحد حجم (در تقویم شمار بر خود که در دایره ، بنده ایسا و ... ) فشار هوا کاهش می یابد

« بنویسید ریاضی » صفحه ۴۸

$$\Delta T = 11^{\circ}\text{C} - (-55^{\circ}\text{C}) = 66^{\circ}\text{C}$$
$$? \text{ km} = 66^{\circ}\text{C} \times \frac{1 \text{ km}}{2^{\circ}\text{C}} = 11 \text{ km}$$

پ) چون عدد دما بر حسب کلوین بزرگتر از دما بر حسب سلسیوس است پس:

$$\text{مقدار مثبت} + \text{دما بر حسب سلسیوس} = \text{دما بر حسب کلوین}$$

$$273 = -55 + K \rightarrow K = 273$$

این به سبب نشان می دهد که اگر به دما بر حسب سلسیوس مقدار مثبت ۲۷۳ را بیفزاییم دما بر حسب کلوین (K) بدست می آید .



شماره  
تاریخ

۲

۲

« توجه کنید »  $K$  (کلوین) و  $^{\circ}C$  (سانتیگراد) در مقیاس علمی  
 رابطه میان دما بر حسب کلوین ( $T$ ) با دما بر حسب سانتیگراد ( $\theta$ ) به صورت زیر  
 نوشته می شود:

$$\frac{T}{1K} = \frac{\theta}{1^{\circ}C} + 273,15$$

\* در واقع نوشتن رابطه  $T = \theta + 273,15$  نادریست از آنجایی که هنگامی  
 جمع جبری می شوند که هم یکجا و یا در دو طرف یکجا باشند.

برای نمونه دمای بدن بر حسب کلوین برابر است:

$$T = \theta + 273,15 \rightarrow T = 37^{\circ}C + 273,15$$

نادریست است زیرا این توان  $37^{\circ}C$  را با یک عدد ثابت جمع کرده در پایین  
 کتیبه با یکای کلوین ( $K$ ) به دقت آورد اما برای هر جسمی زیر دمای بدن  $37^{\circ}C$  است.

$$\frac{T}{1K} = \frac{\theta}{1^{\circ}C} + 273,15 \rightarrow \frac{T}{1K} = \frac{37^{\circ}C}{1^{\circ}C} + 273,15 = 37 + 273,15$$

$$\frac{T}{1K} = 310,15 K \rightarrow T = 310,15 K$$

با هم بنویسیم « صفحه ۵۰ »

دانش آموزان

(دای)

\* توصیه می شود در پرسش ۴ و متونی که آرد با دمای سانتیگراد به ویژه (منفی سرد کار  
 دارند) به برابری دما آن را به کلوین تبدیل نکنید، زیرا درک و استفاده  
 از آن آسان تر است (در جوش  $N_2$ ،  $Ar$  و  $O_2$  به ترتیب  $77K$ ،  $87K$ ،  $90K$  است).  
 (آ) در  $200^{\circ}C$  یا  $273K$  در هوای مایع گاز هلیوم وجود ندارد زیرا هلیوم در دما  
 $4K$  یا  $279^{\circ}C$  مایع می شود. این هوای مایع تنها محقق می شود، اگر کربن  
 و آرگون است.



آ) اکسیدین نمونه را تعظیم کنیم برای درهای جوش آرزو نختیت نیتروژن (۷۷K)، در جوشتر کم و سرد آرگون (با دما جوشتر ۸۷K) و در پایان اکسین (با دما جوشتر ۱۹۰K) جدا کردن جدا جدا می شود.

دین می دهند

ب) در  $195^{\circ}\text{C}$  یا  $78\text{K}$  نختیت نیتروژن جدا می شود (گوی برای آب و بگ، نیتروژن را) سرد در  $185^{\circ}\text{C}$  یا  $88\text{K}$  آرگون جدا خواهد شد (گوشتر سفید رنگ، آرگون را نشان) با این توصیف گوشتر قرمز رنگ، نشان رهنده اکسین هستند.


که لزدای جوش که با آدر است، جوش از زره؟

پ) در دمای  $80^{\circ}\text{C}$  یا  $193\text{K}$  جوش از زره جدا می شود. حالت گاز هستند از این در حالت (۱) در است.


ت) با توجه به این که تفاوت دمای جوش اجزای سازنده هوا کم است (دای جوش آرزو به یکدیگر نزدیک است) جدا سازی هر خرابه صورت صد درصد حاصل ممکن نیست و هم زمان با آن، اندکی از کثیر اجزا نیز جدا می شود.

نمودار بارشما بید « صفحه ۵۳

آ، با دقت نمودار رسم شود.



توجه داشته باشید که در این نمودار، فشار هوا در ارتفاع ۵۳ کیلومتر تقریباً نصف فشار در سطح دریا می باشد.



شماره

تاریخ

از آن جا که  
ب) (نمودار ترموی است پس با اثر اثر ارتفاع از سطح زمین ، فشار هوا و در نتیجه فشار  
گاز اکسیژن کاهش می یابد .

پ ۱) ب نقطه یابی لزوی نمودار ، فشار گاز اکسیژن در ارتفاع  $2.5 \text{ km}$  در حدود  
 $15.2 \times 10^{-2} \text{ atm}$  خواهد بود .

سازگار با

ت) از آن جا که فعالیت های بیولوژیکی بدن انسان متناسب با اکسیژن با فشار  $2.09 \times 10^{-2} \text{ atm}$   
( $15.2 \times 10^{-2} \text{ atm}$ ) است ، با بلاترسی از سطح زمین فشار هوا در نتیجه فشار اکسیژن  
کاهش می یابد . کسول اکسیژن این کاهش فشار را جبران می کند ، فعالیت های  
بیولوژیکی منظم انجام شوند .

\* توجه : با اثر اثر ارتفاع از سطح زمین ، فشار هوا و در پی آن فشار یک یک اجزای  
سازن مانند اکسیژن کاهش می یابد . اما در هر ارتفاعی حدود  $2.1$  از حجم هوا را اکسیژن  
تشکیل می دهد به دیگر سخن از هر  $100$  مول (یا مولکول) هوا ،  $21$  مول (یا مولکول)  
 $0_2$  است . اگر فشار هوا  $1 \text{ atm}$  باشد ، فشار  $0_2$  حدود  $21 \text{ atm}$  است  
است و اگر فشار هوا  $0.5$  باشد ، فشار  $0_2$  برابر با  $0.105 \text{ atm}$  است .

لا مورد را با ترابید " صحنه ۵۶

از فصل ۱ به یاد دارید که آرگون ، گاز نجیب بوده که هر سه لایه اکسرونی  
اتم آن به طور کامل از اکسرونی پر شده است ، از این رو تمایلی به شرکت در واکنش های  
شیمیایی ندارد . با این توصیف یک سیط به اثر برای جوشکاری ایجاد می کند و مانع می شود  
که در آن دمای بالا ، فلز با گاز موجود در هوا به ویژه  $0_2$  ترکیب شود . پس  
در طول عمر فلز جوشکاری شده را اثر اکسرونی دهد .

حجم بند ششم " ۵۷

هم اندازه

۱- در این دو دست سازه ، تعداد قطعه ها با سنگی هم شکل ، و هم رنگ برابریت و تنفی سوره اتصال آنها با یکدیگر تفاوت دارد ، از این رو ، حجم دو دست سازه یکسان می باشد

۲- مطابق قانون پاشیدگی حجم در واکنش ها همیشه برقرار است

$$\text{حجم مواد پس از واکنش} = \text{حجم مواد پیش از واکنش}$$

$$\text{حجم نقره سولفید} = \text{حجم گوگرد} + \text{حجم نقره}$$

$$\text{حجم گوگرد} = ۳۲\text{g} \Rightarrow ۲۴۷,۸\text{g} = \text{حجم گوگرد} + ۲۱۵,۸\text{g}$$

۳- ائیدهای آهنی مانند ینخ در هوای مرطوب زنگ می زنند . زنگار تولید شده به دلیل واکنش آهن با اکسیژن و رطوبت موجود در هواست . در واقع حجم ینخ زنگ زده برابر با حجم ینخ آهنی با حجم اکسیژن و رطوبت جذب شده برای تشکیل زنگ آهنی می باشد

یعنی :

$$\text{حجم ینخ زنگ زده} = \text{حجم اکسیژن و رطوبت} + \text{حجم ینخ}$$

$$\text{حجم اکسیژن و رطوبت} = ۲۱۲۷\text{g} \rightarrow ۲۱۲۱\text{g} + \text{ " " " "}$$

۴- مخلوط واکنش در آغاز تنها شامل مواد واکنش دهنده بوده اما پس از انجام واکنش ، شامل مواد فرآورده (و گاز) همراه باقی مانده اثر از واکنش دهنده ای که در واکنش شرکت نکرده است.

به همین دلیل برابریت قانون پاشیدگی در واکنش ها به صورت زیر نوشته شود:

$$\text{حجم مواد پس از واکنش} = \text{حجم مواد پیش از واکنش}$$




برای نمونه اگر در این شماره ۲ به جای ۳۲گ گوگرد ، ۴گ گوگرد وارد واکنش شود تنها ۳۲گ آن با نقره ترکیب می شود و ۸گ اضافی آن همراه با ۲۴۷,۸گ نقره سولفید در ظرف باقی می ماند



شماره

تاریخ

ن خود را با نام زاید « صفحه ۳



ن خود را با نام زاید « صفحه ۴۱

در شرایط کسین

۱- آ) آلومینیم، زیرا کمترین تولید صاب دی گاز در ظرف صندوی محلول اسید با آن بدین ترتیب

ب) با توجه به این که واکنش پذیری آلومینیم از آهن بدین ترتیب است، انتظار می رود در شرایط کسین زودتر اکسید یابد.

۲- با این که آلومینیم در شرایط کسین زودتر از آهن اکسید می یابد و لایه اکسید تشکیل می دهد اما به دلیل ساختار محکم، پایدار و چسبنده لایه اکسید، این لایه همانند محافظی برای فلز Al عمل می کند و مانع از اکسید شدن نقاط درونی فلز می شود. بنابراین آلومینیم به دلیل تشکیل لایه اکسید محافظ در برابر خوردگی مقاوم خواهد بود این روحی است که رنگار آهن سرد و شکننده بوده و خوردگی به نقاط درونی آن نیز سرایت می کند.

۳- آلومینیم به آسانی اکسید می شود و با تشکیل لایه اکسید، از خوردگی محافظت می شود، از سوی دیگر آلومینیم نقش مفید و موثری در انتقال برق فشار قوی دارد.

در شرایط

ب) از آن جا که چهار فولاد حدوداً برابر آلومینیم است، اگر همه یکسان از فولاد ساخته شود به دلیل چهار بالا، در کل هم باید محکم تر نباشد و به تعداد بدین ترتیب در نوازل نزدیک تر به یکدیگر نصب شوند.

شماره  
تاریخ

۷

به حجم بنده ششم " صفحه ۶۳




|         |           |           |           |                     |     |              |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----|--------------|
| $Cu_2O$ | $CuO$     | $Fe_2O_3$ | $FeO$     | فرمول شیمیایی اکسید | (ب) | ۱-۲ آهن و مس |
| $Cu^+$  | $Cu^{2+}$ | $Fe^{3+}$ | $Fe^{2+}$ | نماد کاتیون         |     |              |


(ب) بار الکتریکی کاتیون با نام درونی در نامگذاری پس از نام فلز آمده است.  
 (ت) در ترکیب های یونی که فلز می تواند دو یا چند کاتیون با بارهای الکتریکی متفاوت داشته باشد (عنصرها دسته d) تحت نام فلز، سپس بار الکتریکی کاتیون آن با عدد رومی (I، II، III، IV و ...) در پایان نام آنیون آمده می شود.

|               |                |             |               |             |                 |               |
|---------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|
| اس (I) سولفید | آهن (III) سیدر | منیزیم سیدر | پتاسیم سولفید | کلسیم اکسید | آلومینیم فلورید | نام ترکیب     |
| $Cu_2S$       | $FeI_3$        | $MgBr_2$    | $K_2S$        | $CaO$       | $AlF_3$         | فرمول شیمیایی |

|                  |                 |                  |                  |               |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| کروم (III) اکسید | کروم (II) کلرید | کروم (III) کلرید | کروم (III) اکسید | نام ترکیب     |
| $CrO$            | $CrCl_2$        | $CrCl_3$         | $Cr_2O_3$        | فرمول شیمیایی |

به حجم بنده ششم " صفحه ۶۴





« باجم بند ششم » صفحه ۶۹

آ) نمودار (۱) اثرات میزان تولید  $CO_2$  را از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۰ میلادی نشان می دهد، بر این اساس مطابق نمودار (۲)، میانگین جهانی دمای زمین و میانگین جهانی سطح آب های آزاد افزایش یافته است این در حالی است که محبت برف در نیمکره شمالی کاهش یافته است به دلیل کاهش با اثرات تولید  $CO_2$ ، میانگین دمای جهانی بدین ترتیب است که باعث ذوب برف در نیمکره شمالی شود و این پدیده، اثرات سطح آب در آنجا را به دنبال دارد.

ب) اثرات تغییر دمای زمین باعث شده برف در زودتر ذوب شوند، در واقع شرایط برای زودتر بیدار شدن گیاهان لذا خواب زمستانی فراهم شده است. از این رو بتواند زودتر و رسیدن گیاهان زودتر آغاز می گردد.

« باجم بند ششم » صفحه ۷۱ (۳)

| ستون ۱                             | ستون ۲         | ستون ۳                                      | ستون ۴                                      | ستون ۵  | ستون ۶                                     |
|------------------------------------|----------------|---|---|---|--|
| برق مصرفی در یک ماه (کیلووات ساعت) | منبع تولید برق | تعداد کربن در اسید تولید شده در یک ماه (kg) | تعداد کربن در اسید تولید شده در یک سال (kg) | تعداد کربن در اسید مصرفی یک درخت تنومند با میانگین قطر ۲۹ تا ۳۴ سانتی متر | تعداد درخت های لازم برای برابری هوا آلودگی |
| $y = 200$                          | زغال سنگ       | $0.8 \times y = 180$                        | $12 \times 180 = 2160$                      | ۵۵,۳  | $\approx 39$                               |
|                                    | نفت خام        | $0.7 \times y = 140$                        | $16 \times 140 = 2240$                      | ۵۵,۳  | $\approx 30$                               |
|                                    | گاز طبیعی      | $0.3 \times y = 60$                         | $4 \times 60 = 240$                         | ۵۵,۳  | $\approx 13$                               |
|                                    | بار            | $0.1 \times y = 20$                         | $1 \times 20 = 20$                          | ۵۵,۳  | $\approx 0.43$                             |
|                                    | سگرمای زمین    | $0.4 \times y = 80$                         | $1 \times 80 = 80$                          | ۵۵,۳  | $\approx 1.3$                              |
|                                    | اثر خورشید     | $0.5 \times y = 100$                        | $1 \times 100 = 100$                        | ۵۵,۳  | $\approx 2.17$                             |

9

شماره

تاریخ

ب) زغال سنگ (پ) برخی منابع انرژی از مواد کربن دار تشکیل شده اند  
 براساس نمونه کبکس همراه زغال سنگ را کربن تشکیل می دهد که هنگام سوختن به طور عمده  $CO_2$  تولید می کند  
 در حالی که نفت خاک و گاز طبیعی به طور عمده از هیدروکربن تشکیل شده اند که هنگام سوختن علاوه بر  $CO_2$  ، بخار آب نیز تولید می کنند .

ت) بار در نظر گرفتن برق مصرفی خانه به طور میانگین ۲۰۰ کیلووات ساعت ( شاید ما هم جزو جدول کامل شده است )

مترکین بر مصرف هستیم ! توجه کنیم !

زیرا سوخت گرانی است

با هم ببینیم ، صفحه ۷۴

آ) هیدروژن (ب) تولید آن صرفه اقتصادی ندارد ( اما تولید و مصرف و ... چگونه ؟ )  
 ب) اگر چه هزینه های اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی آن را در نظر بگیریم ، سوختی به صرفه است ، به همین دلیل برخی کشورها برای تولید گاز هیدروژن سرمایه گذاری می کنند .

• تولید پلاستیک زیست تخریب پذیر هزینه بالایی دارد اما با در نظر گرفتن هزینه های اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی ، مقرون به صرفه تر از پلاستیک آ با پایه نفتی است ، در واقع پلاستیک آ با پایه نفتی ایران تر تولید می شوند اما هزینه های اجتماعی زیست محیطی بالایی دارند که گاه جبران ناپذیر است .

• هر چه تولید و انتشار  $CO_2$  کاهش یابد ، باعث کند شدن اثرات گلخانه ای زمین خواهد شد در نتیجه ذوب برف در نیمکره شمالی و افزایش سطح آب در آزاد ، کندتر می شود .



شماره  
تاریخ

۱۵

۷۸

مؤید بنیاد ۱۱ صفحه ۷۸

(۱)  $\ddot{O} = \ddot{O} - \ddot{O}$ ؛ و  $\ddot{O} = \ddot{O} - \ddot{O}$ ؛ یا  $\ddot{O} = \ddot{O} - \ddot{O}$ ؛

ب) اکسژن و اوزون هر دو در شرایط عادی گازهای بی اثر هستند، اما اکسژن در حالت مایع، آبی رنگ و اوزون مایع، لاجوردی است. کمتری دیگر حجم مولر اوزون ۱۵ برابر اکسژن و دمای جوش با آن (حدود ۱۸۰) بالاتر از اکسژن است.

پ) گاز اکسژن در آب به میزان کم اما مناسبی حل می شود که براساس زندگی آبزیان بسیار ضروری و حیاتی است، اما این اکسژن محلول در آب خاصیت گندزدایی ندارد در حالی که اوزون با ورود به آب باعث از بین رفتن بسیاری از میکروب ها می شود، این ویژگی واکنش پذیرش بیشتر اوزون به اکسژن را نشان می دهد.

ت) تفاوت ساختار کوئیسر اوزون و اکسژن که باعث ایجاد تفاوت در چشم گیر در خواص آنها شده است، در واقع با این است که اوزون و اکسژن از آن هم در یک تکیه شده اند اما تفاوت ساختاری باعث تفاوت در خواص آنها شده است. از این رو برای درک خواص و رفتار باید شناخت ساختار را بررسی نمود.

۵ با هم بنویسیم ۱۱ - صفحه ۷۹

۲) اگر واکنش در جهت (۱) پیش برود، همه اوزون به اکسژن تبدیل می شود و لایه محافظی در برابر تابش فرابنفش خورشید وجود نخواهد داشت این در حالی است که اگر واکنش تنها در جهت (۲) پیش برود، همه اکسژن به اوزون تبدیل می شود و فضا را پر می کند.

ب) واکنشهایی که تنها در یک جهت معین ( جهت رفت ، جهت (۱) ) پیش می روند  
 و کتری کمی برگشت ناپذیر نام دارند مانند سوختن مواد سوختنی ، محال شدن بلاستیک  
 در برابر گرما ، سخت شدن سیان در اثر جذب رطوبت و ...  
 اما واکنشهایی که امکان انجام آنها در هر دو جهت (۱) و (۲) ، جهت رفت  
 و برگشت وجود دارند، برگشت پذیر نامیده می شوند مانند تجزیه میان ، پروخالی شدن  
 باتری های قابل شارژ ، تبدیل اوزون به اکسیژن و ...

پ) براساس معادله واکنش نوشته شده با پیوست واکنش در جهت (۱) ، اوزون  
 مصرف می شود در حالی که با پیوست واکنش در جهت (۲) ، اوزون تولید می شود ، حال  
 اگر میزان مصرف اوزون یا میزان تولید آن همخوانی داشته و برابر  
 کند ، مقدار اوزون موجود در لایه استراتوسفیر ثابت می ماند و نقش  
 می نهد خود را به خوبی ایفا می کند.

لا یاهم بنده سیم " صفحه ۸۲

۱- آنگاه نشان می دهیم که گاز درون سیلندر در فشار ثابت ( وارد از هوا و بستون به آن )  
 است . اگر در فشار ثابت ، دمای یک نمونه گاز افزایش یابد ، جنبش مولکول  
 تسهیل شده و میانگین فاصله میان آنها در پس آن ، حجم افزایش می یابد .

پ) با این توصیف حجم یک نمونه گاز در فشار ثابت با دمای آن رابطه مستقیم  
 دارد .

شماره  
تاریخ

۱۲

۱۲

۲- شکل نشان می دهد در دما و فشار ثابت، با افزایش فشار مویکل (مول) هر گاز، حجم آنرا نیز باید به یک نسبت در دما و فشار ثابت، حجم گاز با فشار مول در آن رابطه مستقیم دارد.

نمودار را با زاویه ۱۸۰ درجه

۱- جابجایی خالی از بالا به پایین به ترتیب:  $10 \times 10^3$  و  $22,4$  و  $2,02 \times 10^{23}$

$$2- \text{ (هوای)} L = 24 \text{ h} \times \frac{70 \text{ min}}{1 \text{ h}} \times \frac{12 \text{ (تنفس)}}{1 \text{ min}} \times \frac{5 \text{ L (هوای)}}{1 \text{ (تنفس)}} = 18720 \text{ L (هوای)}$$

$$? L O_2 = 18720 \text{ L (هوای)} \times \frac{21 \text{ L } O_2}{1 \text{ L (هوای)}} = 1814,4 \text{ L } O_2$$

h : ساعت  
min : دقیقه

$$? \text{ mol } O_2 = 1814,4 \text{ L } O_2 \times \frac{1 \text{ mol } O_2}{22,4 \text{ L } O_2} = 81 \text{ mol } O_2 \quad (ب)$$

با حجم بیشتر ۱۸۰ درجه

$$? \text{ mol } O_2 = 2,5 \text{ mol } C_4H_{12}O_4 \times \frac{4 \text{ mol } O_2}{1 \text{ mol } C_4H_{12}O_4} = 10 \text{ mol } O_2 \quad (ا)$$

$$? L O_2 = 10 \text{ mol } O_2 \times \frac{22,4 \text{ L } O_2}{1 \text{ mol } O_2} = 224 \text{ L } O_2 \quad (ب)$$

$$? g O_2 = 10 \text{ mol } O_2 \times \frac{32 \text{ g } O_2}{1 \text{ mol } O_2} = 320 \text{ g } O_2 \quad (ب)$$

$$? g H_2O = 2,5 \text{ mol } C_4H_{12}O_4 \times \frac{4 \text{ mol } H_2O}{1 \text{ mol } C_4H_{12}O_4} \times \frac{18 \text{ g } H_2O}{1 \text{ mol } H_2O} = 270 \text{ g } H_2O \quad (ب)$$






۱۳۸

شماره

تاریخ

$$? L CO_2 = 2,5 \text{ mol } C_7H_{12}O_4 \times \frac{4 \text{ mol } CO_2}{1 \text{ mol } C_7H_{12}O_4} \times \frac{22,4 L CO_2}{1 \text{ mol } CO_2} = 448 L CO_2$$

لا تمرین ها در دوره اول " صدفی ۸۹۶



$$? \text{ mol } H_2 = 42,5 \times 10^3 \text{ g } NH_3 \times \frac{1 \text{ mol } NH_3}{17 \text{ g } NH_3} \times \frac{3 \text{ mol } H_2}{2 \text{ mol } NH_3} = 73750 \text{ mol } H_2$$

$$? \text{ g } H_2 = 3360 \text{ L } NH_3 \times \frac{1 \text{ mol } NH_3}{22,4 \text{ L } NH_3} \times \frac{3 \text{ mol } H_2}{2 \text{ mol } NH_3} \times \frac{2 \text{ g } H_2}{1 \text{ mol } H_2} = 45 \text{ g } H_2$$

$$? \text{ g } N_2 = 3360 \text{ L } NH_3 \times \frac{1 \text{ mol } NH_3}{22,4 \text{ L } NH_3} \times \frac{1 \text{ mol } N_2}{2 \text{ mol } NH_3} \times \frac{28 \text{ g } N_2}{1 \text{ mol } N_2} = 210 \text{ g } N_2$$

شماره  
تاریخ

۱۴

$$? g H_2O = 1000 g C_{27}H_{11}O_4 \times \frac{1 \text{ mol } C_{27}H_{11}O_4}{190 g} \times \frac{11 \text{ mol } H_2O}{2 \text{ mol } C_{27}H_{11}O_4} \times \frac{18 g H_2O}{1 \text{ mol } H_2O}$$

$$= 1112,34 g H_2O$$

\* لکه کسایش ۱ kg چوبی ، ۱۱۱۲ kg آب تولید می شود

| نام گاز       | نماد فرمول شیمیایی | آرایش الکترونی  | تیمت (دریا) | آلاینده یا غیر آلاینده |
|---------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------------|
| آرگون         | Ar                 | :Ar:            | ۱۹۲         | غیر آلاینده            |
| اکسیژن        | O <sub>۲</sub>     | :O=O:           | ۳۲          | "                      |
| متان          | CH <sub>۴</sub>    | H-C-H<br> <br>H | ۳           | آلاینده                |
| کربن دی اکسید | CO <sub>۲</sub>    | :O=C=O:         | ۴۴          | "                      |
| نیتروژن       | N <sub>۲</sub>     | :N≡N:           | ۲۸          | غیر آلاینده            |

با گاز نیتروژن ، زیرا فزادان ترین و در دسترس ترین گاز بوده و و دگر پذیری بسیار کمی در شرایط عادی دارد.

جای خالی سمت چپ بالا

نیتروژن →

جای خالی سمت راست بالا ← هیدروژن

با تیمانده N<sub>۲</sub> و H<sub>۲</sub>

مستطیل سمت چپ

پایین ← آمونیاک


۶ مولکول NH<sub>۳</sub>

مستطیل پایینی


شماره

۱۵

تاریخ



$$? L CO = 48 g CH_4 \times \frac{1 mol CH_4}{16 g CH_4} \times \frac{2 mol CO}{2 mol CH_4} \times \frac{22.4 L CO}{1 mol CO} = 27.2 L CO \quad (ب)$$



ب) اتانول یک ترکیب آلی اکسیژن دار است، که شندراتمی کربن موجود در هر مولکول آن به مراتب کم تر از حیدروکربن در سازه گانوییل و نترین است از سوی دیگر به دلیل وجود اکسیژن در ساختار آن،  $O_2$  کم تر برای سوختن کامل مصرف می کنند

1-1) بر حسب A

$$? g CO_2 = 18 \dots km \times \frac{12.0 g CO_2}{1 km} = 2,17 \times 10^4 g CO_2 = 2,17 \times 10^3 kg CO_2 \quad (ب)$$

میانگین ۱۲-۱۰

$$? g CO_2 = 18 \dots km \times \frac{13.0 g CO_2}{1 km} = 2,34 \times 10^4 g CO_2 = 2,34 \times 10^3 kg CO_2$$

میانگین

$$? g CO_2 = 18 \dots km \times \frac{127.5 g CO_2}{1 km} = 2,295 \times 10^6 g CO_2 = 2,295 \times 10^3 kg CO_2$$

میانگین

بر اساس چینی محاسبه ای میزان تولید  $CO_2$  سالانه از خودروهای با برچسب D، E، F، G و به ترتیب ۲۹۲۵، ۳۲۴۰، ۳۷۳۵ و ۴۰۵۰ کیلوگرم خواهد شد.

پ) توضیح نشان می دهد که مبنای محاسبه خودرو با برچسب A است. خودرو با برچسب E به طور میانگین به ازای هر کیلومتر،  $2.0 g CO_2$  بس تر تولید می کند، بنابراین:

$$? \text{€} = 18 \dots km \times \frac{2.0 g CO_2}{1 km} \times \frac{1 kg CO_2}{1000 g CO_2} \times \frac{2 \text{€}}{1 kg CO_2} = 21.6 \text{€}$$

نمودار

خودرو E باید  $121.6 \text{€} = 100 + 21.6$  مالیات پرداخت کند.

شماره

تاریخ

①

فصل سوم

خود را با زباید " صفحه ۹۳

۱- (ا) اکسید، سولفید، نیترید، کربنید، فسفید و ...  
 (ب) اکسیدها، سولفیدها، نیتریدها، کربنیدها، فسفیدها، ...  
 (از کسوف)

در آب حل می شوند، گاهی برخی مواد از فاضلاب های خانگی و صنعتی نیز همراه آنها به دریا وارد می شود. موجودات زنده در دریا نیز خود تولید کننده برخی از این مواد هستند  
 ۲- این جمله نشان می دهد که در زمین چنانچه مواد در یک چرخه طبیعی در میان هوا، آب، خاک، گیاهان و جانوران، این چرخه جاری

دارد. مواد نسیان به یون زمین از دیدگاه شیمیایی این دانش آموزان می تواند به بارگاران آخر صدم ۹۲  
 این عنوان مباح این متن را ارائه کند


۳- (ا) گروه ۱ (ب)  $Cl^-$  (یون کلرید) (ج)  $Na^+$  (یون سدیم)  
 (ت)  $NaBr, MgCl_2, KCl, CaCl_2, NaCl$


۴- آب شیرین و در دسترس ما در حد بسیار کمی از آب در موجود در جهان را تشکیل می دهد. این ویژگی مصداق "آب مایع کمیاب در زمین افراد اگر"

خود را با زباید " شماره ۹۹

۱- همین فرمول نویسی و نامگذاری که در کلاس انجام می شود، پیش از این تقریباً بی

۲- آمونیوم سولفات :  $(NH_4)_2SO_4$





« با هم نندیشیم » صفحه ۱۰۳

(ب)

$$1g = \text{جرم حل شونده} \quad , \quad \text{جرم محلول} = 42g = (50 - 8)g$$

(ب)

$$\text{جرم شونده} = 1g = \frac{\text{جرم شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 100 = \frac{1g}{50g} \times 100 = 2\%$$

(ب)

$$\text{جرم شونده} = 1g = \frac{\text{جرم شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 100 = \frac{1g}{50g} \times 100 = 2\%$$

(ب) درصد جرمی محلول ، جرم ماده حل شونده را در صدگرم محلول نشان می دهد.

(ب)

$$\text{درصد جرمی محلول} = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 100$$

(ث) این جمله نشان می دهد که از هر ۱۰۰g محلول استرین سیریم کلرید ، ۹g آن NaCl و ۹۹g باقیانده آب (محلول) است .

« بخور را بیازماید » صفحه ۱۰۴

| ppm   | درصد جرمی | مقدار یون (میلیگرم در لیتر محلول) | نماد یون                      | نام یون     |
|-------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| ۱۹۰۰۰ | ۱٫۹       | ۱۹۰۰۰                             | Cl <sup>-</sup>               | یون کلرید   |
| ۱۰۵۰۰ | ۱٫۰۵      | ۱۰۵۰۰                             | H <sup>+</sup>                | یون هیدروژن |
| ۲۶۵۵  | ۲٫۶۵۵     | ۲۶۵۵                              | SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> | یون سولفات  |
| ۱۳۵۰  | ۱٫۳۵۰     | ۱۳۵۰                              | Mg <sup>2+</sup>              | یون منگنیز  |
| ۴۰۰   | ۰٫۴۰۰     | ۴۰۰                               | Ca <sup>2+</sup>              | یون کلسیم   |
| ۲۸۰   | ۰٫۲۸۰     | ۲۸۰                               | K <sup>+</sup>                | یون پتاسیم  |





$$2- \text{درصد جرم محلول} = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 100 \rightarrow 37.5 = \frac{\text{جرم حل شونده}}{1.5 \times 10^4 \text{ Ton}}$$

$$\text{جرم حل شونده} = 5.625 \times 10^6 \text{ Ton}$$

$$3- \text{درصد جرم قند (در نوشابه کوچک)} = \frac{\text{جرم حل شونده (قند)}}{\text{جرم محلول (نوشابه)}} \times 100 = \frac{39 \text{ g}}{330 \text{ g}} \times 100 = 11.8\%$$

$$\text{درصد جرم قند (در نوشابه بزرگ)} = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 100 = \frac{108 \text{ g}}{1500 \text{ g}} \times 100 = 7.2\%$$

« با هم بنویسیم » صفحه ۱۰۶

۱- (آ) حجم محلول (ب) شمار ذره (مول) در حل شونده

$$\begin{aligned} \text{پ) در محلول سمت چپ: } 10 \times 0.01 \text{ mol} &= 0.1 \text{ mol} & 0.1 \text{ mol} &= 0.2 \text{ mol L}^{-1} \\ \text{در محلول سمت راست: } 5 \times 0.01 \text{ mol} &= 0.05 \text{ mol} & 0.05 \text{ mol} &= 0.1 \text{ mol L}^{-1} \end{aligned}$$

ت) شمار مول در حل شونده در یک لیتر محلول، غلظت مولی (مولار) نامیده می شود و با یکای  $\text{mol L}^{-1}$  بیان می شود.

ث) محلول سمت چپ با غلظت مولی  $0.2 \text{ mol L}^{-1}$ ، غلظت مرکز محلول سمت راست با غلظت مولی  $0.1 \text{ mol L}^{-1}$  است.

$$2- \text{آ) } \frac{\text{حلال}}{\text{حل شونده}} \quad \text{ب) } \frac{\text{کافستر}}{\text{اکترالتر}}$$

$$\text{ب) } \frac{\text{حلال}}{\text{حل شونده}} \quad \text{کافستر} \quad \text{اکترالتر}$$

شماره  
تاریخ

شماره

تاریخ

مخبر: رابینا زابید، صفحه ۱۰۹

مخبر

۱- (آ) در دمای  $25^{\circ}\text{C}$ ، انحلال پذیری سیم نیترات برابر با  $92\text{g}$  است در واقع  $92\text{g}$  از آن در  $100\text{g}$  آب حل می شود و در این دما  $192\text{g}$  محلول سیر شده سیم نیترات پدید می آید.  
 براساس این نسبت، حداکثر  $184\text{g}$  سیم نیترات در  $200\text{g}$  آب حل می شود و  $384\text{g}$  محلول سیر شده پدید می آید. با این توصیف  $7\text{g}$   $190\text{g} - 184\text{g} = 190\text{g}$  سیم نیترات حاصل در آن ظرف باقی می ماند. (ب)

۲- (آ) چون در افراد سالم نمک در کیم دار (بازنده سنگ کلیه) آه نشین نمی شود، پس مقدار این نمک در ادرار این افراد از انحلال پذیری آنها کم تر است و در  $37^{\circ}\text{C}$  سیر شده است.  
 ب) ابتدا به سنگ کلیه نشان می دهد، نمک در کیم دار (بازنده سنگ کلیه) آه نشین می شود، در واقع مقدار این نمک در ادرار بیش از انحلال پذیری آن افراد است.  
 این افراد

۳- مواد محلول: شکر، سیم نیترات و سیریم کلرید.  
 رسک محلول: کیم سولفات.  
 رسک محلول: کیم ففات، ترقه کلرید و باریم سولفات.

مخبر: سید شمس، صفحه ۱۱۰

۱- (آ) در  $85^{\circ}\text{C}$ ، انحلال پذیری آن در حدود  $24\text{g}$  است و انحلال پذیری  $21\text{g}$  مربوط به دمای  $50^{\circ}\text{C}$  است.  
 ب) نقطه C، محلول سیر شده و نقطه B محلول فرا سیر شده را نشان می دهد. هر نقطه روی منحنی انحلال پذیری، محلول سیر شده را در آن دما نشان می دهد و نقاط زیر منحنی، تهیه کننده پیش نویس محلول های سیر شده و نقطه آه را نشان می دهد (اما نزدیک به آن) محلول فرا سیر شده را نشان می دهند.

\* توجه: اگر نقطه A مانند B فاصله زیادی تا منحنی انحلال پذیر داشته باشد، محلول سردتر همراه با ماده جامد اضافی ته نشین شده در ظرف را نشان می دهد.

پ) انحلال پذیر لیتیم سولفات در  $20^{\circ}\text{C}$  برابر با  $33\text{g}$  و در  $70^{\circ}\text{C}$  برابر با  $125\text{g}$  است. برای توصیف دیگر محلول سرد را از  $20^{\circ}\text{C}$  تا  $70^{\circ}\text{C}$  گرم کنیم انتظار می رود،  $125\text{g} - 133\text{g} = 8\text{g}$ ، لیتیم سولفات جامد ته نشین شود.

ت) سدیم کلرید ( $\text{NaCl}$ )، زیرا نمودار ۲ نشان می دهد که با افزایش دما (از  $0^{\circ}\text{C}$  تا  $100^{\circ}\text{C}$ ) انحلال پذیری آن (۵ تا ۶ گرم) افزایش می یابد. به میزان کمی

ث) نقطه A (عض از مبدأ) نشان دهنده میزان انحلال پذیری  $\text{KCl}$  را در دمای  $0^{\circ}\text{C}$  نشان می دهد.

مانند  $A|y_1^{x_1}$  و  $B|y_2^{x_2}$

لا یونید با ریاضی ۱۱ صفحه ۱۱۱

۱- آ) برای نوشتن معادله خط می توان با داشتن مختصات دو نقطه از آن خط

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$


به صورت زیر عمل کرد: این رابطه برای  $y = f(x)$  نوشته شده است، برای دانستن دمای انحلال پذیری،  $S = f(\theta)$  می توان نوشت:

$$\frac{S - S_1}{\theta - \theta_1} = \frac{S_2 - S_1}{\theta_2 - \theta_1} \rightarrow \frac{S - 72}{\theta - 0} = \frac{100 - 72}{100 - 0} \rightarrow \frac{S - 72}{\theta} = \frac{1}{10}$$

$$S - 72 = 0.1\theta \rightarrow S = 0.1\theta + 72$$

(ب)

$$S = 0.1\theta + 72 \xrightarrow{\theta = 70^{\circ}\text{C}} S = 0.1(70) + 72 = 128$$



$$\frac{S - S_1}{\theta - \theta_1} = \frac{S_2 - S_1}{\theta_2 - \theta_1} \rightarrow \frac{S - 27}{\theta - 0} = \frac{33 - 27}{20 - 0} \rightarrow S = 0.3 \theta + 27$$

(مقدار  $\theta$  به اندازه  $x=0$ )

۳- در هر معادله خط به صورت  $y = ax + b$  ،  $a$  نشان عرض از مبدا و  $b$  نشان دهنده شیب خط است. با این توصیف در معادله  $S = 0.3\theta + 27$  ،  $27$  نشان دهنده عرض از مبدا و  $0.3$  نشان دهنده شیب خط است. چون شیب خط سیم نترات ( $0.3$ ) بیش تر از شیب خط پتاسیم کلرید ( $0.2$ ) می باشد پس اثر دما بر انحلال پذیری سیم نترات بیش تر است.

ب) عرض از مبدا برای سیم نترات ( $27$ ) از پتاسیم کلرید ( $27$ ) بیش تر است یعنی در  $0^\circ C$  ، انحلال پذیری سیم نترات بیش تر از پتاسیم کلرید می باشد. از سیم نترات خط انحلال پذیری سیم نترات ( $0.3$ ) از پتاسیم کلرید ( $0.2$ ) است. با توجه به این دو عامل ، در هر دما ، انحلال پذیری  $NH_4NO_3$  از  $KCl$  در آب بیش تر است.

لا به الله سند ششم « صفحه ۱۱۳

موکول ۱۵۱ آن

۱- (آ)  $HCl$  ، زیرا در میدان الکتریکی جهت گیری کرده اند. ب) دمای جوش  $HCl$  حدود  $103^\circ C$  بالاتر از  $F_2$  است ، این ویژگی نشان می دهد که برای غلبه بر نیروهای بین مولکولی در  $HCl$  و تبدیل آن حالت مایع به بخار ، انرژی گرمایی بیش تری نسبت به  $F_2$  نیاز است. به دیگر سخن نیروهای بین مولکولی در میان موکول  $F_2$  قوی تر از موکول  $HCl$  است. با توجه به این دو عامل ، در هر دما ، انحلال پذیری  $NH_4NO_3$  از  $KCl$  در آب بیش تر است.

ب) مایه ، قطبی ، متفاوت ، ناقطبی

۷

۲-۳) انتظار می رود موکول دوامتی CO (برخلاف  $N_2$ ) در میدان الکترونی جهت گیری نماید، زیرا موکول های دوامتی که از اتم های نوناگون تشکیل می شوند، قطبی هستند.

ب) هر چه نیروی بین موکولی (قوی تر باشد) در شش رابطه بین درمادی بالاتری به جوش می آید به دیگر سخن اگر مواد در حالت گاز باشند، هر چه نیروی بین موکولی قوی تر باشد، آن تر به مایع تبدیل می شوند، باری توصیف CO در شش رابطه بین آن، آن تر به مایع تبدیل می شود زیرا از موکول های قطبی با نیروی بین موکولی قوی تر تشکیل شده است.

۵ خود را بنویسید « صفحه ۱۱۲

۴) غیر، زیرا از موکول های دوامتی با اتم های یکسان تشکیل شده اند، چنین موکول های ناقطبی بوده و در میدان الکترونی جهت گیری نمی کنند. در شش رابطه بین حالت فیزیکی، می توانند کمیتی برابر مقداری قدرت نیروی بین موکولی (بیشتر) باری توصیف نیروی بین موکولی در دمای قوی تر از برم و آن هم قوی تر از کلر است.

۶)  $\frac{\text{اثر از اثر}}{\text{کاهش}}$  ،  $\frac{\text{کاهش}}{\text{اثر از اثر}}$

۵ بنویسید « صفحه ۱۱۵

۱-۳) در جدول سمت چپ،  $NH_3$  و در جدول سمت راست HF، زیرا درمادی جوش هر یک برخلاف جسم مولی کم تر آنها، غیر عادی بالاتر از دیگر مواد هم راسته است.

ب)  $\frac{\text{قوی تر است}}{\text{ضعیف تر است}}$  ،  $\frac{F, Cl, Br}{F, N, O}$

۲- در مقدار آنال، اتم هیدروژن با یونید اتم اکسیژن متقبل است پس میان موکول های آن، تهیه کننده پیش نویس سوندا قوی هیدروژن وجود دارد و باید در جوش بالاتر از استون در دمای ۷۸°C مربوط به آنال و ۵۶°C مربوط به استون است.



شماره

تاریخ

۵ خرداد ۱۳۵۷ «صفحه ۱۱۷»

آ) شکل سمت چپ نشان می دهد، جرم آب در مخ نسیان بوده اما آب پیراز انجمار  
و تبدیل به یخ، با انفراتریم همراه است، از این رو جگالتر - یخ کم تر از آب است  
به همین دلیل - یخ در آب شناور می ماند

ب) آب موجود در یاخته در کلم، هنگام انجمار و تبدیل شدن به یخ، با انفراتریم  
روبرو شده و باعث پاره شدن دیواره یاخته می شود، به طوری که بافت گیاه  
تخریب می شود.

۵ خرداد ۱۳۵۷ «صفحه ۱۱۸»

در ظرف (آ)، حالت فیزیکی در سه تاس مخلوط نسیان نیست زیرا - یخ، حالت جامد و آب،  
حالت مایع دارند اما ترکیب شیمیایی هر دو ۱۱۲۵ بوده و نسیان است.  
در ظرف (ب) حالت فیزیکی در سه تاس مخلوط نسیان است زیرا آب و هگزان  
هر دو به حالت مایع هستند، اما ترکیب شیمیایی متفاوت است، هگزان  
از مولکول در نا قطبی اما آب از مولکول در قطبی تشکیل شده است.

نتیجه: اگر هر دو ویژگی حالت فیزیکی و ترکیب شیمیایی  
در سه تاس مخلوط نسیان باشد، آن را محلول و اگر یکی نباشد  
آن را مخلوط ناهمگن می نامند.  
هر یک از آنها یا هر دو آنها

۵ با هم بندیم «صفحه ۱۲۰»

۱- (آ) آب و استون، هر دو از مولکول در قطبی تشکیل شده اند، از این رو در استون  
آب حل می شود.  
ب) میسر هگزان، هر دو از مولکول در نا قطبی تشکیل شده اند، از این رو در هگزان  
حل می شود.

پ) هگزون از موکول در ناقطبی اما آب از موکول در قبطی تشکیل شده است از این دو هگزان در آب حل نمی شود (اعدل پذیر بسیار ناچیز) و گیت مخلوط نا همگن بدید می آید.


۲- جمدار درست و کاربرد است که بیان می کند، حل شوند در قبطی در حدال در قبطی و حل شوند در ناقطبی در حدال در ناقطبی مگر حل می شوند.

۳- چون هم در موکول آب (H<sub>2</sub>O) و هم در موکول اتانول (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH)، اتم هیدروژن پیوند اشتراکی به اتم اکسیژن متصل است، در میان موکول در آب خالص، در میان موکول در اتانول خالص و هم صحنه میان موکول در اتانول با آب در محلول، پیوند های

هیدروژنی وجود دارد  
از آن جا که های جوش حراریم میاری از قدرت نیرو در بین موکول است بر پیوندهای هیدروژنی میان موکول در آب با دمای جوش ۱۰۰ درجه سانتیگراد و در میان موکول در اتانول با دمای جوش ۷۸ درجه سانتیگراد است. با توجه به تشکیل محلول اتانول در آب می توان گفت که پیوند در هر دو دهنی در ۷۸ درجه سانتیگراد قوی تر از میانگین آب خالص و در حدال است.




$$۷۸ < ۸۹ < ۱۰۰ \rightarrow ۷۸ + ۱۰۰ = ۱۷۸ \div ۲ = ۸۹ = \text{میانگین}$$

این مثال نشان می دهد میانگین دو دانه، از دانه کوچکتر، بزرگتر اما از دانه بزرگتر، کوچک تر است. با این توصیف پیوند در هیدروژنی میان موکول در اتانول و آب در محلول از پیوندهای هیدروژنی میان موکول در آب، ضعیف تر و از پیوند های هیدروژنی میان موکول در اتانول قوی تر است. تجربه نشان می دهد که پیوند هیدروژنی آب - اتانول از میانگین پیوندهای هیدروژنی در آب - اتانول + اتانول - اتانول قوی تر است. این ویژگی در حل اتمال اتانول در آب -



پ) با اتمال اتانول در آب، با همدار موکولی C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH، دچار تغییر، تبدیل یا تحریف شده است. به همان ساختار موکولی در میان موکول در حدال (آب) فقط با تشکیل پیوند های تهیه کننده پیش نویس هیدروژنی جدید برکنده شده است.

موضوع: ...



۲-۲ (۲) (ب) (۳)

موضوع: ...

۱-۳ این نمودار تاثیر فشار گاز بر میزان انحلال پذیری آن را در دمای ثابت نشان می دهد، به طوری که هر چه فشار گاز در دما ثابت افزایش یابد، میزان انحلال پذیری گاز در آب بیش تر می شود.

ب) قانون هنری: میزان انحلال پذیری یک گاز در آب، با فشار گاز در دما ثابت رابطه مستقیم دارد.

پ) برای گاز NO شیب نمودار تندتر است، در واقع با افزایش فشار گاز NO در دمای ثابت، اثر بیشتر انحلال پذیری محسوس تر است زیرا NO برخلاف N<sub>2</sub> و O<sub>2</sub> از مولکول های قطبی تشکیل شده است.

۲-۳ این نمودار تاثیر دما را بر میزان انحلال پذیری گاز در فشار ثابت (1 atm) نشان می دهد، به طوری که با افزایش دما از انحلال پذیری گاز در آب کاسته می شود.

ب) ۲۵°C (پ) افزایش می یابد به طوری که انحلال پذیری N<sub>2</sub> در ۴°C حدود 1 mg و در ۲۰°C حدود ۳ mg است.

۳-۳ انتظاری بود NO، مولکول های قطبی، انحلال پذیری بیش تر از CO<sub>2</sub>، مولکول های ناقطبی داشته باشد، زیرا آب از مولکول های قطبی تشکیل شده و مولکول های ناقطبی را بهتر و بیش تر در خود حل می کنند.



ب) نکته هم این است که  $NO$  در آب موکولی است در حالی که موکول  $CO_2$  در آب با انجام واکنش شیمیایی و تولید محلول اسیدی ( $pH < 7$ ) حل می شوند. انجام واکنش شیمیایی است می شود که انحلال پذیری  $CO_2$  در آب (بیش از  $NO$ ) باشد.

و شش ارتباط میان

ن ماهم بند ششم « صفحه ۱۲۵

ا)  $KOH(aq)$  ، زیرا روئناپی بیش تری در لامپ مدار ایجاد شده است.

ب)  $H_2O(aq)$  ، « « « « « اندکی « « « « «

پ)  $C_2H_5OH(aq)$  ، زیرا روئناپی در لامپ مدار ایجاد شده است.

ت)  $KOH$  ، الکترولیت قوی ،  $H_2O$  ، الکترولیت ضعیف و  $C_2H_5OH$  غیر الکترولیت است.

ن ماهم بند ششم « صفحه ۱۲۹


۱) با گذشت زمان تنها موکول  $H_2O$  با عبور از غشای نیمه تراوا از آب خالص به پور آب دریا مهاجرت می کنند (پدیده اسمز).

ب) ضربه باری روشن آب خالص مصرف شده و آب دریا رقیق تر می شود در واقع باری روشن نمی توان آب دریا را نمک زدایی کرد.

پ) وارد کردن فشار به پیستون مانع از مهاجرت نمود به نمود موکول در آب از آب خالص به آب دریا (محمول) می شود. به طوری که اگر فشار وارد شده به پیستون به یک حد معین برسد، مهاجرت موکول در آب متوقف می شود.

از آب خالص به پور محلول





در همین برگه (تقریباً) صفحه ۱۳۳

| شماره مطلوب                      | ۱   | ۲   | ۳   | ۴   | ۵   | ۶   |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| غلظت مولی (mol L <sup>-1</sup> ) | ۳,۲ | ۴,۸ | ۱,۶ | ۱,۶ | ۱,۶ | ۳,۲ |

۱- ۲، زیرا غلظت مولی آن بیش تر است (ب) محلول در ۱۰۰ ml و محلول ۳ و ۴ و ۵.

(پ) از نقطه کردن محلول او ۳، حجم محلول ۱۰۰ ml و مجموع مول در آن حل شونده ۰,۲۴ mol.

خواهش از این رو:  $\text{غلظت مولی محلول جدید} = \frac{0,24 \text{ mol}}{1 \text{ L}} = 2,4 \text{ mol L}^{-1}$

(ت) با افزودن ۱۰۰ ml آب به محلول شماره ۴، حجم محلول ۱۶۰ ml اما شمار مول در آن حل شونده

۰,۸ mol است پس:  $\text{غلظت مولی محلول جدید} = \frac{0,8 \text{ mol}}{1,6 \text{ L}} = 0,5 \text{ mol L}^{-1}$

(ث) حجم محلول همان ۲۵ ml اما شمار مول در آن حل شونده به ۰,۴ mol می رسد پس:

$\text{غلظت مولی محلول جدید} = \frac{0,4 \text{ mol}}{0,25 \text{ L}} = 1,6 \text{ mol L}^{-1}$

۲- حجم محلول (آب) =  $9 \times 10^3 \text{ g} = 9 \text{ kg}$

جرم اکسژن =  $2,75 \times 10^3 \text{ g} = 2,75 \text{ mg}$

$\text{ppm} = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 10^6 = \frac{2,75 \times 10^3 \text{ g}}{9 \times 10^3 \text{ g}} \times 10^6 = 305,5 \text{ ppm}$

چون اکسژن محلول بیش از ۵ ppm است پس برای اغلب ماهی مناسب نیست.

\* برای آسانی کاری توان ppm را نسبت میلی گرم حل شونده به کیلوگرم محلول در

تقریباً (به طوری که:  $\frac{1 \text{ mg}}{1 \text{ kg}} = 1 \text{ ppm}$ )

۱۴

۳- ۷۰۰ m<sup>3</sup> آب استخراج از با ۷۰۰۰۰۰ L یا ۷۰۰۰۰۰۰ kg است.

۷۰۰ g = حجم حل شونده → ۱ =  $\frac{\text{حجم حل شونده}}{۷۰۰۰۰۰۰ g} \times ۱۰^6$  → ppm =  $\frac{\text{حجم حل شونده}}{\text{حجم محلول}} \times ۱۰^6$

\* در واقع برای ضد عفونی کردن آب این استخراج ۷۰۰ g کلریم صورت محلول نیاز است؛ این برصیف برابر تا همین آن به ۱۰۰ kg محلول ۷٪ درصد جرمی نیاز است زیرا:

درصد جرمی محلول =  $\frac{\text{حجم حل شونده}}{\text{حجم محلول}} \times ۱۰۰$  → ۰.۰۷ =  $\frac{۷۰۰ g}{\text{حجم محلول}} \times ۱۰۰$

حجم محلول = ۱۰۰۰۰۰ g = ۱۰۰ kg

سازنده

۴- حوضچه گتاور در قطبی موزون در ماده ای بزرگ تر باشد، موزون کمی آن قطبی تر و با جرم مولی مشابه، نیروی کشش بین موزون<sup>ان</sup> قوی تر و دامای جوشتر بالادری دارند.

۳) C، زیرا موزون کمی آن قطبی تر است. و میتوان گفت ناقصی اندیس

ب) A > B > C (پ) زیرا میزان قطبی بودن موزون<sup>ان</sup> در آن کم بوده که در حدال ناقصی مانند هگزان به میزان بیش تر حل می شود.

۵- ۲) در آب آتش معدنی، ۴۱ و در آب دریا، ۱۱۱ است.

ب) با افزایش دامای میزان اعتدال بندری ۰.۲، هم در آب آتش معدنی و هم در آب دریا کاسته می شود.

پ) بله، نمک ترکیب کمی یونی هستند که هنگام اعتدال در آب، با جاذبه کمی قوی یون - در قطبی موزون<sup>ان</sup> تشکیل می دهند، از این رو اغلب آنرا به خوبی در آب حل می شوند اما ۰.۵ از موزون<sup>ان</sup> ناقصی تشکیل شده که با جاذبه کم ضعیف وانفادرواس در آب حل می شوند. حال اگر در یک نمونه تهیه کننده پیش نویس آب حل شوند یونی به میزان زیادی حل شده باشند موزون<sup>ان</sup> در آب عمال کم تر برابر اعتدال موارد دیگر و نیز گازها دارد.

۱۵

\* افزودن نمک شکر به بطور مختصر نوشتار و فوج سریع در سید گاز از آن نشان می دهد که آب سائل بیش تر به انحلال  $\text{NaCl}$  دارد تا به انحلال گازهای مانند  $\text{O}_2$  و  $\text{CO}_2$ .

یعنی با افزودن محل شوند بیش تر به انحلال تا پدید آمدن محلول سیر شده می شود

۶- (آ) مواد مانند شکر، انحلال پذیری معینی در آب با دما  $25^\circ\text{C}$  دارند که طوری که در هر ۱۰۰g آب  $25^\circ\text{C}$  در ۲۰۵g شکر حل شده و ۳۰۵g محلول سیر شده پدید می آید و مطابق شکل ۹۵g شکر در ته ظرف باقی می ماند.

(ب) برخی مواد مانند روغن (ترکیب در نقطه) در آب نامحلول هستند یعنی به میزان بسیار ناچیز در آب حل می شوند و با افزودن بیش تر آنرا انحلال پذیری تغییری نمی کنند.

(پ) برخی مواد مانند اتانول، به هر نسبتی در آب حل می شوند و هیچ گاه نمی توان از آنها محلول سیر شده تهیه کرد. در واقع با افزودن بیش تر اتانول به آب به محلول آبی دست می یابیم که در آنها اتانول محلول در آب حل شوند خواهد بود.

۷- (آ) کلسیم سولفات، ترکیب یونی جامد است که به عنوان گچ طبی به کار می رود در حالی که آمونیم نیترات یکی از کودهای شیمیایی محلول در آب است که برابر است با گچ کوهان معروف می شود.

(ب) انحلال پذیری حجم حل شونده را در ۱۰۰g آب با در میان نشان می دهد پس حجم محلول سیر شده کلسیم سولفات و آمونیم نیترات به ترتیب  $100.2g$  و  $165.5g$  است از این رو:

$$\frac{2}{100} \approx \frac{0.2g}{100.2g} \times 100 = \frac{\text{حجم حل شونده}}{\text{حجم محلول سیر شده}} \times 100 = \frac{\text{درصد جرمی محلول سیر شده کلسیم سولفات}}{\text{حجم محلول سیر شده}}$$

درصد جرمی محلول سیر شده آمونیم نیترات

$$= \frac{165.5g}{165.5g} \times 100 = 100\%$$

شماره  
تاریخ

۱۶

از آن

۱-  $4 \times 10^{12}$  لیتر آب دریا هم ارز،  $4 \times 10^{12}$  kg است.

$$ppm = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 10^6 = \frac{1 \text{ g}}{4 \times 10^{12} \text{ g}} \times 10^6 = 2,5 \times 10^{-8}$$

این مقدار، حساسیت بسیار بالایی است و انسان می تواند  
زیرا ppm خلطی است که برای محلول در رقیق و بسیار رقیق به کار می آید  
اما این مقدار کمی بسیار کوچکی است.

\* در انسان تر، نسبت میلی گرم در هر لیتر خون به کیلوگرم بدن است

$$\left( \frac{1000 \text{ g}}{4 \times 10^{12} \text{ g}} = 2,5 \times 10^{-8} \right)$$

در عدد درجه ۱۱۹



جزوه های بیشتر (کلیک کنید):

گام به گام رایگان دهم | | نمونه سوال دهم | | جزوه آموزشی دهم |



جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

## ابتدایی

اول ✓ دوم ✓ سوم ✓ چهارم ✓ پنجم ✓ ششم ✓

## متوسطه اول

هفتم ✓ هشتم ✓ نهم ✓

## متوسطه دوم

دهم ✓ یازدهم ✓ دوازدهم ✓