

فعالیت

خاک‌های مختلف، ذراتی با اندازه‌های مختلف دارند. تحقیق کنید که رشد ریشه‌گیاهان در خاک‌های رسی و ماسه‌ای با چه چالش‌ها و فرصت‌هایی روبروست؟

هر چه میزان شن بیشتر، نفوذپذیری بیشتر، زه کشی بیشتر، تهویه بیشتر، مواد غذایی کمتر خواهد بود.

هر چه میزان رس بیشتر، نفوذپذیری کمتر، زه کشی کمتر، تهویه کمتر، مواد غذایی بیشتر خواهد

جذب مواد معدنی در خاک

مخلوطی از رس و شن برای خاک مناسب است.

نیتروژن و فسفر دو عنصر مهمی هستند که در ساختار پروتئین‌ها و مولکول‌های وراثتی شرکت

می‌کنند. گیاهان، این دو عنصر را بیشتر از خاک جذب می‌کنند.

فعالیت

آزمایش را طراحی کنید که به کمک آن بتوان تأثیر کاهش یا افزایش مواد معدنی را در رشد و نمو گیاهان تعیین کرد.

- این آزمایش به روش های مختلف می تواند انجام شود به شرط آن که بر اساس روش علمی استوار باشد. کنی از بهترین روشها کاشت گیاه در محلولهای هیدروپونیک و یا محیط کشت است. این محیطهای کشت دارای همه عوامل و شرایط مورد نیاز برای رشد است به جز یک عامل. بنابر این میتوان هر نوع تغییر رژیم یا تغییرات ظاهری را به آن نسبت داد. روشهای علمی دیگر نیز میتوانند مورد پذیرش قرار گیرد.

پلارس

فعالیت

مشاهده روزندهای سطح پشتی برگ

- الف) یک برگ شاداب تره را انتخاب کرده و سطح پشتی و رویی آن را مشخص کنید.
- ب) برگ را از محل رگبرگ میانی به بیرون شکسته ولی روپوست را پاره نکنید. هر نیمه را به نحوی به طرفین بکشید تا روپوست نازک آن از بافت‌های زیرین جدا شود. این کار اگر با دقت انجام شود روپوست غشایی و بی‌رنگ را جدا می‌کند.
- پ) نمونه را در یک قطره آب، روی تیغه شیشه‌ای قرار دهید و با تیغک بپوشانید. یاخته‌های روپوست و نگهبان روزنہ را در بزرگ‌نمایی‌های مختلف مشاهده کنید. آیا می‌توانید سبزدیسنهای را در این یاخته‌ها ببینید؟
- ت) تعداد روزندهای موجود در میدان دید را شمارش کنید. تعداد روزنہ را در واحد سطح برگ تعیین کنید.
- ث) با استفاده از تیغ تیز و با احتیاط، نمونه‌های روپوست پشتی را از برگ گیاهان میخک، شمعدانی و برگ بیدی تهیه و زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. یاخته‌های روپوست و نگهبان روزنہ را در این گیاهان و تره مقایسه کنید.

بخش پ) بله

بخش ت) با توجه به بزرگ‌نمایی میکروسکوپ میدان دید را محاسبه کرده و تعداد روزنے ها را واحد سطح (ممولا میکرومتر مربع) محاسبه می‌کنیم.

فعالیت

مشاهده باز و بسته شدن روزنہ‌های هوایی

- الف) همانند فعالیت قبل، روپوست تره یا کاهو را تهیه کنید و درون محلول‌های 0.5 g KCl ، آب خالص و آب نمک ۴ درصد در روشنایی قرار دهید. مشابه این نمونه‌ها را تهیه و در تاریکی قرار دهید.
- ب) پس از ۱۵ دقیقه، روپوست را در یک قطره از همان مایعی که درون آن قرار دارد، زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. در کدام محلول‌ها روزنہ‌ها باز و در کدام بسته‌اند؟ آیا میزان باز یا بسته بودن روزنہ‌ها یکسان است؟ چرا؟
- پ) پس از ۱۵ دقیقه نمونه‌های تاریکی را به سرعت زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. چرا باید به سرعت آنها را مشاهده کنیم؟ وضعیت روزنہ‌ها را با مرحله قبل مقایسه کنید.
- ب) در روشنایی روزنے‌های موجود در آب خالص و 0.5 g KCl درصد کلرید بتایسم باز و در محلول ۴ درصد آب نمک بسته‌اند. روزنے‌های تبدیلی همگی بسته‌اند. میزان باز شدن روزنے‌ها تابع عوامل درونی و بیرونی است و اگر همه شرایط به جز یکی ثابت باشد میتوان نتیجه گرفت که آن متغیر عامل رفتار روزنے‌هاست. در محلول‌های روشنایی میزان باز بودن یا بسته بودن وابسته به غلظت مواد محلول است. بتایسم این منفذ روزنے‌ها در محلول نیم درصد با آجرک‌خانه شیره‌پروردگار.
- پ) در بسیاری از گیاهان خشکی روزنے‌های هوایی ^{می‌دانید} که شیره پرورده، تاریک آتا جدوم نیزدی حرسته می‌شوند. حرکت علت آن پروردگار همه پتایسم و کلر در مجاورت نور و نیز تجمع بعضی‌قندان در سلولهای نگهبان روزنے است. بخشی از گیاه که ترکیبات آلی مورد نیاز بخش‌های دیگر گیاه را تأمین می‌کند، محل منبع و بخشی از گیاه که ترکیبات آلی به آنجامی روندو ذخیره یا مصرف می‌شوند، محل مصرف نامیده می‌شود. برگ‌ها از مهم‌ترین محل‌های منبع هستند. بخش‌های ذخیره‌کننده مواد آلی، هنگام ذخیره این مواد، محل مصرف و هنگام آزادسازی آن، محل منبع به شمار می‌آیند. برای تعیین سرعت و ترکیب شیره‌پروردگار می‌توان از شته‌ها استفاده کرد (شکل ۱۹).